

## 【重要】感染症関連検査について

滋賀医科大学看護師特定行為研修センターでの研修を受講する場合は、**下記の内容を厳守**してください。  
厳守されない場合は、本学の決まりにより当センターへの**入校（研修受講）が禁止**されます。

- ・ 本学の基準を厳守してください（その他の基準は適応されませんので、ご注意ください）。

### 1. 検査データの有効期限について

検査（測定）項目	有効期間
インターフェロン $\gamma$ 遊離試験（IGRA）	研修受講等終了予定日から <b>2年以内</b> （研修受講等開始予定日より <b>1年以内</b> ）
麻疹・風疹・水痘・ムンプス・HBs 抗体	研修受講等開始予定日より <b>3年以内</b>

※上記の期間以外は認められません。

### 2. 検査（測定）方法について

検査（測定）項目	検査（測定）方法
インターフェロン $\gamma$ 遊離試験（IGRA）	<b>T-SPOT 法</b> 、若しくは <b>QFT 検査</b>
麻疹・風疹・水痘・ムンプス	<b>IgG-EIA 法</b>
HBs 抗体	<b>CLIA 法</b>

※上記の検査（測定）方法以外は認められません。

### 3. 本学の基準（ワクチン接種の必要性）

#### A) 4種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）抗体検査

下記の検査（測定）値の場合、母子手帳や職場健診等、過去に1歳以上で1回の接種歴が書面で確認できれば、別紙2（健康診断証明書）のワクチン接種報告欄に接種日を転記の上で、追加で1回のワクチン接種を行い、接種歴が確認できるコピーを添付してください。確認できなければ2回のワクチン接種を行ってください（接種部位をかえて、同時に複数接種することは可能）。尚、2回のワクチン接種が必要な場合、1回目のワクチン接種後、抗体価が基準値に達していたとしても、2回目ワクチン接種は免除されません。

<b>2.0</b>	<b>≧</b>	<b>麻疹 IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>16.0</b>
<b>2.0</b>	<b>≧</b>	<b>風疹 IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>8.0</b>
<b>2.0</b>	<b>≧</b>	<b>水痘 IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>4.0</b>
<b>2.0</b>	<b>≧</b>	<b>ムンプス IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>4.0</b>

#### B) 4種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）抗体検査

下記の検査（測定）値の場合、4週間以上あけて2回のワクチン接種を行ってください（接種部位をかえて、同時に複数接種することは可能）。尚、1回目のワクチン接種後、抗体価が基準値に達していたとしても、2回目ワクチン接種は免除されません。

<b>麻疹 IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>2.0</b>
<b>風疹 IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>2.0</b>
<b>水痘 IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>2.0</b>
<b>ムンプス IgG-EIA 法</b>	<b>&lt;</b>	<b>2.0</b>


C) HBs 抗体検査

下記の検査（測定）値の場合、3回のワクチン接種を行ってください。但し、過去にワクチンの3回接種を2クール※行った接種歴が書面で証明できれば、別紙2（健康診断証明書）のワクチン接種報告欄に接種日を転記（2クール分）し、接種歴が確認できるコピーを添付してください。尚、1回目または2回目のワクチン接種後、抗体価が基準値に達していたとしても、2回目以降のワクチン接種は免除されません。但し、2クール行ったワクチン接種歴が書面で確認できれば、ワクチンの追加接種は不要となります。


※ 0. 1. 6ヶ月の3回のワクチン接種を1クールとします。

**HBs 抗体 < 10.0**

4. 麻疹・風疹・水痘・ムンプスワクチン接種のフローチャート



5. B型肝炎ワクチン接種のフローチャート



6. 抗体価の考え方

	抗体価陰性	抗体価陽性 (基準を満たさない)	抗体価陽性 (基準を満たす)
麻疹	IgG-EIA 法 < 2.0	IgG-EIA 法 < 16.0	IgG-EIA 法 ≥ 16.0
風疹	IgG-EIA 法 < 2.0	IgG-EIA 法 < 8.0	IgG-EIA 法 ≥ 8.0
水痘	IgG-EIA 法 < 2.0	IgG-EIA 法 < 4.0	IgG-EIA 法 ≥ 4.0
ムンプス	IgG-EIA 法 < 2.0	IgG-EIA 法 < 4.0	IgG-EIA 法 ≥ 4.0
HBs 抗体	CLIA 法 < 10.0		CLIA 法 ≥ 10.0

## 7. その他

- ・ やむを得ない理由によりワクチン接種が行えない場合は、その理由がわかるもの（診断書等）を添付してください。
- ・ 感染症関連検査は、研修受講開始までにワクチン接種等を全て終わらせてください。但し、B型肝炎ワクチンの接種が必要な場合、3回の接種（1クール）を終わっておくことが望ましいですが、これに限り研修受講開始までに最低2回（0.1ヶ月）のワクチン接種は終わらせてください。
- ・ 不明な点があれば滋賀医科大学看護師特定行為研修センター（平日9時～17時：077-548-3573）まで連絡してください。

参考：一般社団法人日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン第3版」（2020年7月27日発行）

[http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/vaccine-guideline\\_03\(3\).pdf](http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/vaccine-guideline_03(3).pdf)